

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ АМАЛГЕРОЛ ЕССЕНС, РК

Перед застосуванням уважно прочитайте етикетку!

АМАЛГЕРОЛ ЕССЕНС, РК

Універсальне добриво, біостимулянт, укорінювач, антистресант,
кондиціонер та біоактиватор ґрунту

Препаративна форма: розчинний концентрат.

Вміст препарату: екстракт морських водоростей *Ascophyllum nodosum* – 17 %, стияж та екстракт стияжу – 83 % (N загальний – 3,17 % w/w, K₂O – 3,67% w/w, органічна речовина – 36,5 % w/w)).

Реєстраційний номер: 15103, серія А 09663. **Закінчення терміну реєстрації:** 31.12.2031.

Класифікація ВООЗ, токсичність: 4 клас небезпечності.

Призначення та механізм дії: Амалгерол Ессенс, РК – комплексний препарат, що проявляє властивості добрива, кондиціонера ґрунту, біостимулянту росту та розвитку рослин. Чинить позитивний вплив на мікробіоценоз та аерацію ґрунту, підвищує засвоєння рослинами поживних речовин із ґрунту, та, прискорюючи ріст мікроорганізмів, сприяє розвитку кореневої системи культур та утворенню мікоризи, підвищує імунітет та стійкість рослин до несприятливих умов навколишнього середовища. Не фітотоксичний для сільськогосподарських культур. Під дією мікроорганізмів розкладається на 100%.

Застосування: перед використанням препарат слід ретельно збовтати. Визначену кількість препарату розчинити у воді, добре перемішати. Використовувати для поливу, обприскування рослин, замочування саджанців. Не рекомендується застосовувати при сильному сонячному світлі, при температурі повітря понад 25 °С та під час заморозків. Температура води для приготування робочого розчину не вище +25 °С.

Регламенти застосування:

Культура	Норми витрати препарату	Призначення	Спосіб, час обробок	Максимальна кратність обробок
Яблуня	30-40 мл/10 л води/100 м²	Зняття стресів, захист від заморозків, підвищення врожайності, покращення якості плодів. Розвиток кореневої системи та покращення приживання після пересадки	Обприскування рослин в період вегетації	3
Томати	30 мл/4 л води/100 м²		3	
Капуста	20-30 мл/ 4-5 л води/ 100 м²		Обприскування рослин, позакореневе підживлення, полив методом краплинного зрошення, полив розсади 0,5% розчином	3
Огірки				
Картопля				
Суниця				
Малина				
Картопля	20 мл/10 кг	Розвиток кореневої системи, підвищення врожайності та якості врожаю	Обробка бульб (обприскування перед посадкою)	1
Виноград*	30 мл/8-10 л води/100 м²	Поліпшення фізіологічного стану рослин, підвищення врожайності та покращення його якісних характеристик	Обприскування рослин в період вегетації	3
Лохина*	30 мл/8-10 л води/100 м²		Полив методом краплинного зрошення, або обприскування рослин в період вегетації	3

* згідно з реєстрацією у промисловому секторі

Особливості застосування:



Оптимальна схема застосування – до 3 (трьох) обробок за сезон залежно від культури та її потреб.



Застосування весною та восени сприяє зміцненню імунітету рослин в т.ч. розсади, саджанців та дорослих дерев; а також допомагає рослинам легше переносити стрес від різких перепадів температури.



Під час весняних заморозків у період цвітіння застосовують препарат за 1-3 дні до прогнозованого зниження температури у нормі 40-45 мл/10 л води (обприскуванням). Можлива повторна обробка після нормалізації температурного режиму.



Літні обробки сприяють збільшенню врожайності, зняттю стресів внаслідок граду, посухи тощо. Також сприяють покращенню росту плодів, набору цукрів.

Способи обробки:



Замочування (укорінення) розсади/живців та саджанців перед висаджуванням (потім додати в лунку) в 1% розчині (100 мл/10 л води).



Полив під корінь через 5-7 днів після висаджування, а також в період вегетації 0,5% розчином (50 мл/10 л води).



Внесення через систему краплинного зрошення відповідно до вказаних у таблиці норм.



Позакореневе (листове) обприскування в період вегетації, відповідно до вказаних у таблиці норм.

Сумісність з іншими препаратами: препарат сумісний із більшістю пестицидів та добривами, перед застосуванням бакових сумішей необхідно провести пробне змішування.

Заходи безпеки: роботу з препаратом проводити з використанням засобів індивідуального захисту, дотримуватися правил особистої гігієни.

Перша медична допомога: якщо препарат потрапив на шкіру чи в очі – промити великою кількістю води. За ознак нездужання – звернутися до лікаря. Антidot відсутній.

Знищення залишків і тари: у разі витікання препарату засипати його піском або землею. Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію та водойми. Знешкоджуйте пакування відповідно до вимог законодавства у спеціально призначених місцях.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці в місцях недоступних для дітей, окремо від харчових продуктів та кормів для тварин при температурі від +5°C до +25°C. Уникати прямого сонячного проміння та відкритого вогню.

Виробник: Хешенбіхлер ГмбХ, Кузанусвег 7-9, Інсбрук 6020, Австрія.

Ексклюзивний постачальник в Україні: ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн», 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 172-А, 11 пов., тел.: (044) 494-37-04, сайт: small.summit-agro.com.ua.

Фасувальник: ТОВ «ФОРПАК», 35331, Рівненська обл., с. Городок, вул. Б. Штейнгеля, 4а, тел.: (0362) 61-14-00. Розфасовано згідно ТУ У 20.2-41780881-001:2024

Пакування: 100 мл.

Дата виготовлення: зазначено на упаковці.

Гарантійний термін зберігання: 36 місяців.



Маркування відповідно до Регламенту (ЄС) 1272/2008 (CLP): EUN401 – Для уникнення виникнення ризиків для здоров'я людини і довкілля дотримуйтеся інструкцій з безпечного використання.

ЗБЕРІГАТИ В ОРИГІНАЛЬНІЙ УПАКОВЦІ В НЕДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦЯХ, ОКРЕМО ВІД ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН ТА МЕДИКАМЕНТІВ!