

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ АКАРАМІК, КЕ

Перед застосуванням уважно прочитайте етикетку!

АКАРАМІК, КЕ

Інсектицид для захисту плодових та овочевих культур від комплексу шкідників, в т.ч. від кліщів, попелиць, мінерів, трипсів, медяниці

Препаративна форма: концентрат, що емульгується.
Діюча речовина: абамектин, 18 г/л.
Реєстраційний номер: 16157, серія А 10366. **Дата закінчення терміну реєстрації:** 31.12.2033.
Класифікація ВООЗ, токсичність: 2 клас небезпечності.
Призначення та механізм дії: Акарамік, КЕ – інсекто-акарицид контактно-шлункової дії, який проникає в листя та діє на комах, що живляться як на зовнішній, так і на внутрішній стороні листка. Абамектин паралізує комах відразу після застосування, але повна загибель настає через 3-5 днів.

Регламенти застосування:

Культура	Шкідливий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробок	Строк останньої обробки до збирання врожаю	Максимальна кратність обробок
Яблуня	Павутинні кліщі (глодовий, туркестанський павутинний, червоний плодовий) та бурий плодовий кліщ, попелиці, мінери, трипси, медяниці	1,0-1,5	Обприскування в період вегетації	14	3
Томати закрито-го ґрунту	Звичайний павутинний кліщ, західний квітковий трипс	0,7-1,0		7	2

Строки виходу працюючих на оброблені території: для проведення механізованих робіт – 3 дні, для проведення ручних робіт – 7 днів.

Фітотоксичність: не фітотоксичний при дотриманні рекомендацій щодо застосування.

Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину: перед застосуванням препарат слід перемішати. Заповнити бак обприскувача на 1/10-1/4 водою, почати перемішування, додати необхідну кількість Акарамік, КЕ. При заповненні баку шланг, що подає воду, має бути вище рівня води в баку. Ретельно вимішати розчин. Продовжувати перемішування під час обробки. Для приготування робочої суміші необхідно використовувати тільки чисту воду. Норма витрати робочої рідини: сади: 800-1000 л/га; овочі: 400-600 л/га. Робочий розчин має бути використаний протягом 24 годин після приготування.

Сумісність з іншими препаратами: зазвичай Акарамік, КЕ не застосовують у сумішах з іншими препаратами.
Особливості застосування: обприскування препаратом рекомендується проводити за допомогою наземної техніки в ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Рекомендується використовувати тракторні обприскувачі. Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільськогосподарськими культурами, водойм і місць відпочинку при застосуванні вентиляторних обприскувачів повинна становити не менше 300 м. Не перевищувати норму витрати, вказану на етикетці та уникати зносу препарату на сусідні культури, людей, що задіяні в обприскуванні, та сторонніх спостерігачів. Не готувати робочу рідину поблизу джерел питної води. Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства. Для захисту бджіл та інших комах-запилювачів, не застосовувати під час цвітіння! Не використовувати під час активного льоту бджіл. Перемістити на значну відстань пасіку або закрити льотні отвори вуликів на час застосування. Не застосовувати препарат при наявності квітучих бур'янів.

Яблуня

1 мірний стакан = 20 мл

15 мл

10 л води

1 сотка

Томати

1 мірний стакан = 20 мл

10 мл

5 л води

1 сотка

Умови та заходи безпеки під час роботи, транспортування і зберігання: всі роботи, пов'язані зі зберіганням і застосуванням препарату проводять у відповідності з ДСП «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98. Всі особи, які працюють з препаратом, повинні мати повсякденні про право роботи з пестицидами. До роботи з препаратом не допускаються особи, молодші 18 років, вагітні та жінки матері-годувальниці, а також особи, у яких при попередньому медичному огляді виявлені захворювання, що є протипоказанням для роботи з пестицидами. Працюючі з препаратом повинні використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, очей і шкіри. При роботі з препаратом суворо забороняється приймати їжу, пити і курити. Тривалість роботи з препаратом не повинна перевищувати 4 годин на добу. Не припускається спільне перевезення препарату з продуктами харчування, отрутохімікатами. Препарат слід зберігати в закритій заводській упаковці у сухому, темному, прохолодному складському приміщенні, що призначене для зберігання пестицидів та обладнане вентиляцією. Категорично забороняється використання тари з-під препарату для зберігання і транспортування харчових продуктів, фуражу і питної води. Уникати прямого сонячного проміння та відкритого вогню. Рекомендована температура зберігання від 0 °C до +30 °C.

Перша медична допомога: в разі контакту з препаратом або робочим розчином негайно ретельно промити шкіру (очі) великою кількістю води і замінити спецодяг. При підозрі на отруєння негайно припинити роботу і викликати лікаря. Очі промивають свіжою чистою водою у великій кількості: не менше 10 хвилин. При попаданні в органи дихання – вийти на свіже повітря. При проковтуванні дати потерпілому велику кількість активованого вугілля з великою кількістю води. При проковтуванні великої кількості концентрату необхідна консультація лікаря. Після надання першої медичної допомоги потерпілого необхідно відвезти у лікарню. **ВАЖЛИВО!** Не можна нічого вводити через рот потерпілому, який знаходиться у непритомному стані. **АНТИДОТ** – специфічного антидоту немає, застосовувати симптоматичну терапію (уникати активаторів ГАМК – барбітурати, бензодіазепіни, вальпроєва кислота).

Заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків при застосуванні пестициду: у разі розливу препарату зібрати його адсорбентом (пісок, тирса), забруднені шари ґрунту видалити, запакувати в упаковку, яка не допускає його висипання, та передати для подальшого знешкодження суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускати потрапляння у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари. Забороняється повторне використання тари. Використані контейнери з-під пестициду, повинні бути зруйновані (пробиті) і передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право такого суб'єкта господарювання на утилізацію використаної тари з-під пестицидів. Знешкодження спецодягу, обладнання, також, слід проводити згідно вимог викладених в ДСП 8.8.1.2.001-98. Обприскувачі після закінчення робіт обробити засобом ДІАС (1 л на 10 л води) або кашницею хлорного вапна (1 кг на 4 л води) з подальшою промивкою водою. Всі заходи по знешкодженню необхідно проводити в засобах індивідуального захисту.

Протипожежні заходи. Засоби пожежогасіння: розпилення води, сухий порошок, піна, вуглекислий газ. Не використовувати суцільний струмінь води, оскільки він може розсіювати і поширювати вогонь. При термічному розкладанні або горінні можуть виділятися токсичні пари, наприклад оксид вуглецю, оксид азоту, діоксид сірки. Поради для пожежників, захисне спорядження: одягніть автономний дихальний апарат і повний комплект засобів індивідуального захисту.

До відома споживача: виробник гарантує якість своїх пестицидів, поставляючи їх в оригінальній упаковці. Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання даного препарату. Споживач цього препарату є повністю відповідальним за вибір конкретних методів його використання та приймає на себе ризик, пов'язаний із зберіганням та використанням даного препарату. Виробник та постачальник не несе відповідальності за збитки наслідок порушення вимог зберігання, транспортування або недотримання користувачем рекомендацій щодо використання, зазначених на етикетці.

Заявник: Rotam Agrochemical Company Limited, KHP.

Виробники: Jiangsu Rotam Chemistry Co Ltd, KHP; Industrias Afrasa S.A., Іспанія.

Офіційний імпортер в Україні: ТОВ «Самміт-Агро Україн», вул. Антоновича, 172, літера А, поверх 11, м. Київ, 03150, Україна; тел.: +38(044) 494-37-04, сайт: small.summit-agro.com.ua.

Фасувальник: ТОВ «ФОРПАК», 35331, Рівненська обл., с. Городок, вул. Б. Штейнгеля, 4а, тел.: (0362) 61-14-00 Розфасовано згідно ТУ У 20.2-41780881-001:2024.

Пакування: 100 мл.

Дата виготовлення та номер партії: зазначена на упаковці.

Гарантійний термін зберігання: 3 роки з дати виготовлення за дотриманням умов зберігання.



ОТРУТОХІМІКАТ! ЗБЕРІГАТИ В ОРИГІНАЛЬНІЙ УПАКОВЦІ В НЕДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦЯХ, ОКРЕМО ВІД ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН ТА МЕДИКАМЕНТІВ!