

# ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ АРТЕМІКС, КС

Перед застосуванням уважно прочитайте етикетку!

## АРТЕМІКС, КС

### Фунгіцид для захисту плодових та овочевих культур від грибкових і бактеріальних хвороб

**Препаративна форма:** концентрат суспензії.

**Діючі речовини:** оксихлорид міді, 239,36 + гідроксид міді, 236,64 г/л.

**Реєстраційний номер:** 15098, серія А 09659. **Дата закінчення терміну реєстрації:** 31.12.2032.

**Класифікація ВООЗ, токсичність:** 2 клас небезпечності.

**Призначення:** Артемікс, КС – контактний фунгіцид, що має профілактичну дію та призначений для запобігання грибковим і бактеріальним захворюванням, що вражають виноградники, томати, яблуна, персики та волоський горіх.

**Регламенти застосування:**

Культура	Хвороби	Норма витрати препарату	Спосіб, час обробок	Максимальна кратність обробок
Яблуна	Парша, плямистості, бактеріальні хвороби	30 мл/12 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	3
Персик	Кучерявість персика, клястероспориоз, бактеріальні хвороби	30 мл/6 л води на 1/2 сотки	Обприскування до розпускання бруньок	1
		30 мл/12 л води на 1 сотку	Обприскування після цвітіння	2
Виноградники*	Мілдью, антракноз, чорна плямистість	30 мл/8 л води на 1 сотку	Обприскування в період вегетації	4
Томати*	Фітофтороз, альтернаріоз, бактеріальні хвороби	30 мл/5 л води на 1 сотку		3
Горіх волоський*	Бактеріальні хвороби	30 мл/6 л води на 1/2 сотки		3

\*згідно реєстрації у промисловому секторі

**Строк останньої обробки до збору врожаю:** яблуна, персики, виноградники – 30 днів, горіх волоський – 35 днів, томати – 14 днів.

**Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину:** необхідну кількість препарату додати в бак обприскувача на 1/3 наповненого водою, перемішати, потім долити водою до потрібної кількості. Рекомендована норма витрати робочої рідини для обприскування: яблуні, персика, горіха – 800-1000 л/га; виноградників – 600-800 л/га; томатів – 400-500 л/га.

**Сумісність з іншими препаратами:** сумісний з пестицидами, за винятком органофосфатів, лужних препаратів та препаратів на основі діючої речовини тирам. В будь-якому випадку рекомендується провести попередній тест на хімічну сумісність препаратів, що змішуються.

**Рекомендації щодо застосування:** для підвищення ефективності та обмеження виникнення резистентності до фунгіцидів з інших хімічних груп, застосовуйте препарат Артемікс, КС поперемінно з іншими фунгіцидами. Обприскування рекомендується проводити в ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, водойм тощо становить не менше 300 м. Уникати зносу препарату на сусідні культури, людей. Строки виходу людей на оброблені площі для проведення механізованих/ручних робіт: яблуня, персики, виноградники, томати, горіх волоський – 3 доби / 7 діб. Препарат дозволений до використання в Україні за умов дотримання регламентів застосування і вимог природоохоронного законодавства. Безпечність для нецільових об'єктів: дуже токсично для водних організмів з довготривалими наслідками.

**Умови та заходи безпеки під час роботи, транспортування і зберігання:** всі роботи, пов'язані із застосуванням препарату проводять у відповідності з ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві». Під час робіт слід суворо дотримуватися правил особистої гігієни, забороняється приймати їжу, пити і курити. Завжди використовувати засоби індивідуального захисту. Тривалість робіт не повинна перевищувати 4 годин на добу. Препарат слід зберігати в закритій заводській упаковці в прохолодному складському приміщенні, призначеному для зберігання пестицидів, в місцях недоступних для дітей. Не зберігати разом з продуктами харчування та кормами для тварин. Уникати прямого сонячного проміння та відкритого вогню (ДБН В.2.2-7-98 «Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин»). Забороняється використання тари з-під пестициду для зберігання і транспортування харчових продуктів, фуражу і питної води. Рекомендована температура зберігання від +5 °С до +25 °С.

**Перша медична допомога:** при потрапленні препарату в дихальні шляхи: перенесіть потерпілого на свіже повітря. Зробіть штучне дихання, якщо потерпілий не дихає. Викличте лікаря! Якщо пульс відсутній, необхідно здійснити серцево-легеневу реанімацію. Не допускайте охолодження потерпілого. Якщо у потерпілого судоми, спостерігайте за його диханням. Тримайте підборіддя так, щоб дихальні шляхи залишалися вільними. При потрапленні препарату на шкіру чи очі: промити великою кількістю води протягом 15 хв. При потрапленні препарату в шлунок: негайно викликати лікаря! НЕ викликати блювання, якщо потерпілий знаходиться в несвідомому стані. Якщо він може ковтати, негайно дати випити кілька склянок води з активованим вугіллям, викликати блювання. Повторити процедуру декілька разів, після чого дати випити потерпілому склянку води, в якій розмішані 4-5 таблеток карболену або активованого вугілля (2 ст. ложки), а потім сольове проносне (20 г глауберової солі або сірчаноокислої магнезії на ½ склянки води). Після надання першої допомоги потерпілого слід доставити в найближчий медпункт або лікарню. Лікування симптоматичне. Спеціального антитоду немає.

**Заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків при застосуванні пестициду:** забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускати потраплення у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари. Забороняється повторне використання тари. Після застосування тара з-під пестициду повинна бути приведена в непридатність. Використані, попередньо промиті контейнери з-під пестициду повинні бути передані для утилізації суб'єкту господарювання, який має ліцензію у сфері поводження з небезпечними відходами та якою передбачено право на утилізацію використаної тари.

**Протипожежні заходи.** Засоби пожежогасіння: розпилення води, піна, вуглекислий газ. Не використовуйте суцільний струмінь води, він може розсіювати і поширювати вогонь. Поради для пожежників: використовуйте автономний дихальний апарат і повний комплект засобів індивідуального захисту.

**До відома споживача:** виробник гарантує якість своїх пестицидів, поставляючи їх в оригінальній упаковці. Споживач цього препарату є повністю відповідальним за вибір конкретних методів його використання та приймає на себе ризик, пов'язаний із використанням даного препарату. Виробник та постачальник не несе відповідальності за збитки внаслідок порушення рекомендацій щодо використання, зазначених в етикетці. Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання даного препарату.

**Виробники:** Гован Кроп Протекшн Лімітед, Великобританія на заводі Ізагро С.п.А., Італія.

**Офіційний імпортер в Україні:** ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн», вул. Антоновича, 172, літера А, поверх 11, м. Київ, 03150, Україна; тел.: +38(044) 494-37-04, сайт: small.summit-agro.com.ua

**Фасувальник:** ТОВ «ФОРПАК», 35331, Рівненська обл., с. Городок, вул. Б. Штейнгеля, 4а, тел.: (0362) 61-14-00 Розфасовано згідно ТУ У 20.2-41780881-001:2024.

**Пакування:** 100 мл

**Дата виготовлення:** зазначена на упаковці.

**Гарантійний термін зберігання:** 2 роки з дати виготовлення за дотриманням умов зберігання.



**ОТРУТОХІМІКАТ! ЗБЕРІГАТИ В ОРИГІНАЛЬНІЙ УПАКОВЦІ В НЕДОСТУПНИХ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦЯХ, ОКРЕМО ВІД ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН ТА МЕДИКАМЕНТІВ!**