

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ СІЛКЕР, KE

Перед застосуванням уважно прочитайте етикетку!

СІЛКЕР®, KE

**Засіб для фізичної іммобілізації дрібних шкідників
КОНТРОЛЬ ШКІДНИКІВ БЕЗ ПЕСТИЦИДІВ!**

Препаративна форма: концентрат, що емульгується.

Діюча речовина: 75% поліалкіленоксид модифікований гептаметилтрисилоксан + запатентована суміш полімерних сполук.

Призначення та механізм дії: препарат призначений для контролю шкідників шляхом їх фізичної іммобілізації. Після висихання робочого розчину, препарат обмежує рух шкідників, блокує та ускладнює харчування на рослині. СІЛКЕР, KE не містить хімічних діючих речовин як у традиційних засобів захисту рослин (інсектицидів чи акарицидів), а контролює чисельність шкідників фізичним шляхом за допомогою зовнішнього ефекту іммобілізації/склеювання. А також, продукт застосовується в якості партнера для бакових сумішей з інсектицидами та акарицидами для підвищення їх ефективності.

Сумісність з іншими препаратами: сумісний з інсектицидами, акарицидами та фунгіцидами. Не змішуйте продукт з будь-якими ад'ювантами, особливо для покращення змочування!

Приготування робочого розчину: розрахуйте необхідну кількість препарату СІЛКЕР, KE. Додайте його в попередньо заповнений водою бак оприскувача, а потім ретельно перемішайте. Для застосування СІЛКЕР, KE разом із засобами захисту рослин, приготуйте спочатку робочий розчин останніх, потім додайте рекомендовану кількість препарату СІЛКЕР, KE. Робочий розчин слід використати протягом 24 годин після приготування. Об'єм робочого розчину на одиницю площі має бути достатнім для забезпечення ретельного та рівномірного покриття поверхні рослин без їх надмірного зволоження. Препарат СІЛКЕР, KE рекомендується застосовувати у баковій суміші з інсектицидами та акарицидами у випадку значного заселення шкідниками, які зазвичай важко контролювати звичайним способом (наприклад, листоблішки, трипси).

Регламенти застосування:

Культура	Шкідник	Концентрація (норма витрати) робочого розчину
Плодові дерева та ягідні культури	Попелиці, павутинні кліщі, кліщі-поржавлювачі, личинки щитівок листоблішки. Зниження чисельності трипсів.	0,1% (10 мл препарату на 10 л води)
Цибуля	Тютюновий трипс (зниження чисельності)	0,12% (12 мл препарату на 10 л води)
Томати, перець болгарський, баклажан	Павутинні кліщі, попелиці, імаго білокрилки, личинки щитівок. Зниження чисельності трипсів.	0,05% (5 мл на 10 л води)
Огірки та інші овочі. Декоративні дерева, хвойні насадження та чагарники. Троянди.		0,1% (10 мл препарату на 10 л води)
Інші декоративні культури		0,05% (5 мл на 10 л води)

Рекомендації для ефективного застосування СІЛКЕР, KE:

• Використовуйте достатній об'єм робочого розчину для забезпечення ретельного покриття культури. • СІЛКЕР, KE необхідно застосовувати тоді, коли на рослинах з'являються перші шкідники. Препарат працює тільки при безпосередньому контакті з чутливими шкідниками. Після висихання обробленої поверхні рослини препарат не проявляє біологічної активності. • Обробку необхідно проводити дуже ретельно, охоплюючи всі частини рослин, де можуть знаходитися шкідники. При необхідності, повторні обробки проводять приблизно через 7 днів або пізніше.

Застереження та обмеження щодо використання: 1. При першому використанні рекомендується перевірити розчин на декількох рослинах (невеликих ділянках) для оцінки можливих пошкоджень рослин. Особливо це рекомендується робити у випадку обробки декоративних культур. 2. Застосовуючи на овочах та декоративних рослинах, рекомендується НЕ проводити обробку дуже молодих рослин (наприклад, розсади) через високий

ризик пошкодження рослин. З метою зменшення ризику опіків листя у чутливих сортів овочевих та декоративних культур, а також на яблуні та груші, препарат СІЛКЕР, КЕ необхідно використовувати, коли погодні умови дозволяють робочому розчину дуже швидко висихати на рослинах. 3. Препарат застосовується вдень по сухому листу! Не використовуйте препарат, якщо є ймовірність випадання навіть невеликого дощу чи мряки, а також появи туману або роси протягом 6 годин після обробки. Не рекомендується проводити обробку ввечері, вночі і в умовах високої вологості повітря. За умови повільного висихання робочого розчину на поверхні рослин може підвищитися ризик фітотоксичності. Якщо робочий розчин залишається на рослині протягом більше ніж декілька годин, це може викликати опіки листя чутливих культур (наприклад, груша, томати, гарбузові культури, гербери, тощо). 4. При багаторазовому застосуванні рекомендується щонайменше 2-тижневий інтервал між третьою та четвертою обробками препаратом СІЛКЕР, КЕ. 5. Не обробляйте декоративні та плодові культури під час цвітіння через ризик пошкодження пелюсток. 6. Слід обробляти рослини до стану «цілковито мокрі», проте не допускати надмірного стікання розчину. 7. Не застосовуйте продукт з будь-якими іншими ад'ювантами! 8. Використовуйте СІЛКЕР, КЕ суворо дотримуючись вказівок даної інструкції. **Не перевищуйте рекомендовані концентрації та об'єми робочого розчину для кожної культури!** **Строк останньої обробки до збирання врожаю:** немає потреби встановлювати, оскільки СІЛКЕР, КЕ не містить діючих речовин хімічних засобів захисту рослин.

Безпечність для бджіл: відповідно до проведених досліджень, СІЛКЕР, КЕ не несе ризику для медоносних бджіл. Проте не рекомендується застосовувати продукт під час активного льоту медоносних бджіл, продукт безпечний після висихання на поверхні листа.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній щільно закритій упаковці з тарною етикеткою в сухому, прохолодному, добре провітрюваному приміщенні, в місцях, недоступних для дітей. Забороняється зберігати разом з продуктами харчування, напоями та кормами для тварин. Допустима температура зберігання від 0 °C до +35°C. Захищати від вологості! Не заморожувати!

Застереження! Викликає серйозне подразнення очей. Небезпечний при потрапленні у дихальні шляхи. Токсичний для водних організмів з довготривалими ефектами. Уникайте вдихання аерозолу чи парів продукту. Уникайте потраплення продукту у навколишнє середовище. Використовуйте захисні рукавички та захист для очей. Суворо забороняється виливати залишки препарату у водойми та каналізацію. У випадку розливу препарату – застосувати його піском, землею або синтетичним адсорбентом. При сильному забрудненні ґрунту необхідно зняти його верхній шар, перенести в спеціальні контейнери для подальшого знешкодження згідно законодавства. При потрапленні препарату у водні джерела негайно повідомити відповідні повноважені органи санітарного нагляду. Тара з-під препарату та залишки препарату підлягають утилізації згідно чинного законодавства. Забороняється повторне використання тари для будь-яких цілей.

Перша медична допомога: при попаданні в очі: обережно промийте водою протягом декількох хвилин; при вдиханні: перемістіть постраждалого на свіже повітря, виключіть фактори, що можуть заважати вільному диханню.

РОБОЧИЙ РОЗЧИН ПРОДУКТУ У РЕКОМЕНДОВАНИХ КОНЦЕНТРАЦІЯХ НЕ КЛАСИФІКУЄТЬСЯ ЯК НЕБЕЗПЕЧНИЙ!

До відома споживача: при уникненні ризиків для людини та навколишнього середовища слід дотримуватись вимог інструкції щодо використання даного препарату.

Порушення споживачем вимог інструкції щодо використання препарату може призвести до збитків і заподіяти шкоду навколишньому середовищу. Виробник та постачальник препарату не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок порушення вимог інструкції щодо використання даного препарату.

Заявник та виробник: ICB Pharma Tomasz Świątosławski, Paweł Świątosławski Spółka Jawna, вул. Moździerzowców, 6A, 43-602 Явожно, Польща, тел. +48 32 74 54 700 e-mail: office@icbpharma.com, www.icbpharma.com.

Офіційний імпортер в Україні: ТОВ «Самміт-Агро Юкрейн», вул. Антоновича, 172-А, 11 поверх, м. Київ, 03150, Україна, тел. (044) 494-37-04, сайт: small.summit-agro.com.ua.

Фасувальник: ТОВ «Форпак», 35331, Рівненська обл., с. Городок, вул. Б. Штейнгеля, 4а, тел.: (0362) 61-14-00. Розфасовано згідно ТУ У 20.2-41780881-001:2024. **Пакування:** 50 мл.

Гарантійний термін зберігання: 4 роки від дати виробництва в закритій оригінальній упаковці. **Дата виготовлення та № партії:** зазначено на упаковці.



Формула препарату СІЛКЕР®, КЕ захищена патентом.
СІЛКЕР® є зареєстрованою торговою маркою компанії ICB Pharma.